

施設から保健所へ Q & Aシート

No	分類	質問	回答	備考
1	居室	疥癬および疥癬の疑いがある人のお部屋に他の入居者様が入室する場合の対応方法	お部屋の前にセンサーマットを設置し、入室したら分かるようにする。または、中からカギをかけてもらうなど…	
2	居室	居室内に感染対策で使用したガウンなどを捨てるための段ボールのゴミ箱(フタ付き)を置いているが、それで良いか??	居室内にゴミ箱を設置する際は、足で踏んでフタが開くタイプのゴミ箱もしくは手で蓋を開けなくてはいけないゴミ箱の場合は、蓋は外したまま設置した方が良い(手で蓋を触らないように)	
3	居室	居室内で出たゴミの捨て方	居室内はレッドゾーン、廊下をグリーンゾーンとし、居室内で出たゴミ(レッドゾーン)をまず袋に入れ、グリーンゾーンに出した所で2重目のゴミ袋にゴミを入れ、廃棄する	ゴミの袋は2重にする
4	居室	段ボールにはダニはいる??	段ボールには基本ダニがいておいた方が良いので、感染者の居室内で使用した段ボールのゴミ箱を再利用するときは、スチームアイロンをしっかりとかけるか破棄する	
5	車イス	感染者が車イスで外に出るときの注意	車イスのタイヤにベンザルコニウム液0.05%を噴霧し外に出る ※基本、肌と肌が接触しない限り感染はしない	
6	手指消毒	オイラックスで予防したり、ベンザルコニウムを使用する方法が良いか?	アルコールは効き目が無い為、ベンザルコニウム液0.05%を使用すると良いが、一番効果があるのは手洗いし流水で流す方法が良い(オイラックスで予防しても良いがさほど効果は期待できない)	
7	洗濯物	感染者の洗濯物はどのようにするのが一番良いか?	ヒゼンダニは50度/10分で死滅するため、熱湯(65~70度)に10分付け置きするか、乾燥機にかけてから洗濯すると良い	バスマットは要注意!
8	掃除機	掃除機は使用して良いか?	掃除機の注意点 ①ヘッドで繁殖する②ホースの中に引っかかってるホコリで繁殖する③ホコリが舞う 以上の観点から終息するまでの間はコロコロやウエットシートなどで対応する方が良い	クイックルワイパーは要注意!
9	お薬	ストロメクトールについて	疥癬に罹患すると処方されるお薬 ※15kg未満の体重の子は飲めない、疾患によっては飲めないなどあるため、職員の家族背景など考慮し、危険がある場合には、なるべく介助に入らないような配慮が必要	
10	ヒゼンダニ	どのようなことに注意したら良いか	・潜伏期間は3週間~1か月 ・人肌の上でしか生きれない ・湿度があり36度~37度が一番活発 ・16度を下回ると動きが悪い ※肌と肌を接触させないように注意するのが一番との事	ゴールデンウィーク当たり以降からが要注意